



# Wirus HPV


**Czym jest?  
Czy jest groźny?  
Czy można go leczyć?**

Rak szyjki macicy zajmuje drugie miejsce wśród przyczyn zgonów kobiet w naszym kraju.

Liczne badania naukowe oraz postęp w medycynie potwierdzają związek pomiędzy rozwojem nowotworu a przetrwałym zakażeniem wirusem HPV. Wirus brodawczaka ludzkiego występuje powszechnie na całym świecie i stanowi najczęstszy czynnik zakaźny przenoszony drogą płciową.

Po raz pierwszy uwagę na ten fakt zwrócił niemiecki wirusolog zur Hausen w swej pracy w 1982 roku.

Do tej pory zostało poznanych niemal 200 różnych typów wirusa HPV. Około 40 z nich odpowiedzialnych jest za powstawanie infekcji urogenitalnych zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Wirusy te dzielimy na dwie następujące grupy:



**I. Wirusy niskoonkogenne** wywołują najczęściej łagodne zmiany w postaci brodawek płciowych i kłykcin kończystych lub płaskich w obrębie narządów płciowych.

- **U kobiet** – pochwa, srom, szyjka macicy, odbyt;
- **U mężczyzn** – penis, moszna, krocze, odbyt.

Zmiany te mogą pojawiać się kilka tygodni lub miesięcy po kontakcie z zarażoną osobą.

**II. Wirusy wysokoonkogenne** - prowadzą do rozwoju zmian dysplastycznych

i wykrywane są głównie w komórkach raka szyjki macicy. Przetrwale zakażenie którymkolwiek typem wirusa wysokoonkogenego stwarza wysokie ryzyko wystąpienia nowotworu.

Wirus HPV odpowiedzialny jest również za raka noso-gardzieli czy krtani.

Główną drogą przenoszenia zakażeń wirusem są kontakty seksualne.

Do czynników zwiększającymi ryzyko zakażenia zaliczamy:

- wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego,
- dużą liczbę partnerów seksualnych,
- partnerów seksualnych z grupy ryzyka,
- nieodpowiednią higienę okolic intymnych,
- korzystanie ze wspólnych ręczników, publicznych pryszniców.

Aktualnie nie ma metody leczenia farmakologicznego infekcji wirusem HPV - stąd tak istotna jest profilaktyka i szczepienia.



Najbardziej efektywną formą zapobiegania zakażeniom tym wirusem są szczepienia, określane jako profilaktyka pierwotna. Istotnym instrumentem profilaktyki są także powszechne, przesiewowe badania cytologiczne kobiet, określane jako profilaktyka wtórna. W krajach prowadzących aktywną profilaktykę tej choroby liczba zachorowań na raka szyjki macicy zmniejszyła się o 80%.



Rekomendowany wiek przeprowadzenia profilaktyki pierwotnej to 12-14 lat, a więc okres poprzedzający inicjację seksualną. Liczne badania kliniczne potwierdziły zarówno skuteczność jak i bezpieczeństwo szczepień. Szczepienia zapewniają długą, wieloletnią odporność na zakażenia wirusem HPV. Niepożądane odczyny poszczepienne po podaniu szczepionek przeciw zakażeniom HPV obejmują:

- odczyny miejscowe – ból, zaczerwienienie, obrzęk i świąd;
- odczyny ogólne – bóle mięśni, głowy i zmęczenie; oraz bardzo rzadko objawy alergiczne i objawy ze strony układu pokarmowego.

W grupie nastolatków każde szczepienie (w tym także przeciw zakażeniom HPV) może wiązać się z omdleniem, stąd osoby zaszczepione powinny pozostawać pod obserwacją przez około 15 minut po podaniu szczepionki.

W Polsce szczepienie przeciw zakażeniom HPV należą do grupy szczepień zalecanych, co oznacza, że obowiązkiem lekarza jest poinformowanie



pacjenta lub jego opiekunów o możliwości skorzystania z takiej profilaktyki, ale koszty zakupu wszystkich dawek szczepionki obciążają pacjenta lub jego rodzinę. Stąd należy docenić lokalne inicjatywy samorządowe podejmujące decyzje o finansowaniu szczepień przeciw zakażeniom HPV w grupie nastolatków.

W obecnym programie profilaktyki proponujemy Państwu

**szczepionkę 4-ro walentną Gardasil**

[https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-epar-product-information\\_pl.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-epar-product-information_pl.pdf)



ZOZ ze swojej strony pragnie przyczynić się do zwiększenia poziomu wiedzy rodziców Gminy Siechnice oraz samych młodych pacjentów poprzez spotkania indywidualne, spotkania edukacyjne w szkołach, informacje przekazywane drogą telefoniczną Uruchomiono dwa dodatkowe numery telefonów:



Program polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2020-2021” finansowany jest z budżetu Gminy Siechnice

- - Święta Katarzyna – 533 373181
- - Siechnice – 537373576

służą one tylko i wyłącznie do rozmów w sprawie szczepień.

W celu umożliwienia skorzystania z usług lekarza i pielęgniarki Punkt szczepień będzie uruchomiony w godzinach popołudniowych a także w niektóre soboty.

***Do zobaczenia na szczepieniach***

***Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Świętej Katarzynie***



Program polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2020-2021” finansowany jest z budżetu Gminy Siechnice